

## DOENÇAS DA PRÓSTATA

A próstata é uma glândula encontrada em várias espécies de animais do sexo masculino e que podem apresentar em especial após uma certa idade, uma série de problemas, tais como: hiperplasias benignas (aumento de tamanho), hiperplasias malignas (câncer), inflamações (prostatites), presença de cistos etc. Ela se localiza um pouco abaixo da bexiga e pode quando acima de seu tamanho normal, comprimir a uretra, dificultando a saída da urina.

Em geral, os problemas relacionados a esta glândula irão ocorrer em cães acima dos 9 anos de idade.

**Hiperplasia benigna:** as hiperplasias ou o aumento de tamanho da próstata são comuns e os principais sintomas são: dificuldade de urinar, pois normalmente o cão levanta a pata, mas não consegue urinar ou ela é eliminada através de pequenas gotas ou mesmo através de um jato fino de urina, além de dor abdominal, presença de sangue na urina, apatia, falta de apetite e prostração. O diagnóstico é feito através do exame clínico, toque retal e confirmado com a ultrassonografia.

O tratamento medicamentoso é limitado e o seu atraso pode complicar a situação clínica do animal. Desta forma, o tratamento mais eficaz, é a orquiectomia ou castração, onde é retirado os testículos do cão, que a partir daí por uma questão hormonal, o tamanho da próstata é reduzido em cerca de 70 % em 7 dias após o procedimento.

**Prostatite:** esta é um inflamação simples da glândula, que pode ocorrer sem uma causa definida e normalmente os sintomas são: pequena dificuldade de urinar, mas normalmente a urina está com a presença de sangue, às vezes em grande quantidade, o que assusta e muito o proprietário do animal. O tratamento é mais simples, com a utilização de antibióticos ou mesmo com a própria homeopatia, pode-se eliminar o problema.

**Hiperplasia maligna:** aparentemente os tumores de próstata em cães são menos frequentes do que no homem, no entanto, devemos ficar atentos quanto ao problema, caso o cão macho tenha mais de 9 anos de idade. O diagnóstico é realizado da mesma forma que na hiperplasia benigna, embora os tumores somente são confirmados através da biópsia, no entanto, a imagem da ultrassonografia poderá ajudar na suspeita. O tratamento é a retirada integral da glândula, o que torna a cirurgia um pouco mais complicada e caso o diagnóstico e o tratamento tenha sido realizado precocemente, o que nem sempre acontece, a recuperação é satisfatória.

**Cistos prostáticos:** é a presença de tamanhos variados de cistos localizados no parênquima (interior) da glândula. São comuns e diagnosticados com exames de imagem (normalmente ultrassom abdominal) e o tratamento é a castração ou dependendo do cisto a retirada da própria próstata.

**Prevenção:** em qualquer doença e em qualquer espécie, a prevenção é o melhor caminho, por isto o ideal é que a partir dos 8 anos de idade, o proprietário procure o veterinário para exames clínicos a cada 6 meses e exames complementares (anuais), tais como: raio-x de tórax, eletrocardiograma, ultrassom abdominal e exames de sangue, por exemplo: glicemia (diabetes), hemograma completo e bioquímicos para avaliação da função renal e hepática.